



Rheinland-Pfalz

Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum Mosel

Abteilung Weinbau und Oenologie

Ansprechpartner Rebschutz

Lentes eric.lentes@dlr.rlp.de

Scholtes markus.scholtes@dlr.rlp.de

Seidel peter.seidel@dlr.rlp.de

Ansprechpartner Weinbau

Regnery daniel.regnery@dlr.rlp.de

Ansprechpartner Düngerecht

Hermen stefan.hermen@dlr.rlp.de

www.dlr.mosel.rlp.de

REBSCHUTZMITTEILUNG
MOSEL UND AHR 2024

Nr. 09

08.05.2024

- PERONOSPORA: PRIMÄRINFEKTIONEN -
- OIDIUMRISIKO STEIGT -
- KORREKTUR: PSM AUFBRAUCHFRISTEN -

Aktuelle Lage: alle Bilder ©Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel



In oben aufgeführter Grafik kann man sehr deutlich erkennen, dass es im gesamten Beratungsbezirk mittlere, bzw. schwere Infektionen durch Peronospora gab. Diese fallen unterschiedlich stark aus, je nach gefallen Regenmengen. Hier gab es mancherorts sinflutartige Regenfälle, die zu Abschwemmung und Erosionen führten. Schädigungen durch Hagel und Kraupel gab es nur vereinzelt (siehe linkes Bild oben, Blätter durchlöchert und Triebspitzen abgeschlagen). Mittlerweile erkennt man, bedingt durch den eher schwachen Blattzuwachs der letzten Wochen, erste Befälle von Milben. Insbesondere dort, wo letztes Jahr gravierende Befälle vorzufinden waren, bietet es sich an, im Vorblütebereich zugelassene Schwefelpräparate gg. Rebenpocken- und Kräuselmilbe, zusätzlich zu applizieren (siehe linkes Bild unten). Niederschläge werden vorerst nicht mehr prognostiziert und die langersehnte frühlingshafte Witterung tritt endlich ein. Dort, wo noch keine Spritzung gesetzt wurde, unbedingt zeitnah, vor abgelaufenen Inkubationszeiten, applizieren!


Pilzliche Schaderreger: VitiMeteo-Bekämpfungshilfe

Bernkastel-Kues

Plasmopara Oidium Schwarzfäule Phänologie Schwarzholz Kräuselmilbe Traubenwickler Wetter

Übersicht Kombiansicht Detailsicht

Datum von 2024-04-22 bis 2024-05-14 Grafik aktualisieren




VitiMeteo liefert unterstützende und brauchbare Bekämpfungshilfen. Wie an oben aufgeführter Grafik (Wetterstation BKS, 07.05.2024) veranschaulicht kam es hier zu ersten Bodeninfektionen vom 02. und 03.05.2024. Vor Ablauf der Inkubationszeit (→ max. 80% abgelaufene Inkunabtionszeit (siehe roter Pfeil), sollte dringend appliziert werden, um Sekundärinfektionen zu unterbinden! Insbesondere in den ersten Vorblütespritzungen liefern phosphonathaltige Pflanzenschutzmittel, die dann bei jeder Vorblütespritzung neu angereichert werden müssen, mit die besten Bekämpfungserfolge. Achten Sie darauf, dass wenn Solo-Fungizide mit dem Wirkstoff Phosphonat appliziert werden, immer ein gängiges, zugelassenes Peronospora-Fungizid beigemischt wird. Delan Pro und Profiler beispielsweise, sind fertig formulierte Fungizide, mit Kontaktmittel und Phosphonat, bzw. teilsystemischer Wirkstoff und Phosphonat. Neben den biologischen Parametern und daraus resultierende Entwicklung des Pilzes, liefert VitiMeteo unterstützende Hinweise, wann die Wirkungsdauer endet und der neue Behandlungstermin gesetzt werden sollte (sowohl für Pero als auch Oidium). In unten aufgeführter Grafik wurde am Beispiel Wetterstation BKS ein Pflanzenschutzmittel der Schutzklasse 3 gewählt. Die hier zu erwartende Wirkdauer, zurückzuführen auf anstehende Witterung, Wuchs und Potenz des Fungizids, endet am 15.05.2024.

Bernkastel-Kues

Plasmopara Oidium Schwarzfäule Phänologie Schwarzholz Kräuselmilbe Traubenwickler Wetter

Übersicht Kombiansicht Detailsicht

Datum von 2024-04-22 bis 2024-05-14 Grafik aktualisieren



Info

Legende

Phänologie

Behandlung Wirkungsdauer

Befallsdruck der Lage

☒ Normallage **1**

☐ Befallslage **1**

Produkt | Einwirkungszeit:

Ursprung | 3

Behandlungsdatum:

2024-05-04

Wirkungsdauer anzeigen

Die Wirkung endet am 2024-05-15 nach ca. 11 Tagen und einem Zuwachs von 3 Blättern sowie 252 cm² Blattfläche je Haupttrieb.

Bitte überprüfen Sie die Wirkdauer in einigen Tagen nochmals, da sich die Wettervorhersage ändern kann.

Mittelempfehlungen und Applikationstechnik:

Pflanzenschutzmittel für den Weinbau <u>2024</u>			Basisaufwand je ha	
FUNGIZIDE			ES 09:	
Schaderreger	Produkt / Mittel	Wirkstoff / Wirkstoffgruppe		SF
PERONOSPORA Kontaktwirkstoff	Delan WG	Dithianon	200 g	-
	Flovine	Folpet	400 g	-
	Folpan 80 WDG	Folpet	400 g	-
	Folpan 500 SC	Folpet	600 ml	-
	Polyram WG	Metiram	800 g	x*
	Solofol	Folpet	400 g	-
	Vinifol SC	Folpet	600 ml	-
PERONOSPORA Kontakt- und Tiefenwirkung	Delan Pro	Dithianon + Kaliumphosphonat	1.200 ml	x*
	Foshield (+ Kontaktfungizid)	Kaliumphosphonat	1.000 ml	-
	Frutogard (+ Kontaktfungizid)	Kaliumphosphonat	1.500 ml	-
	Phosfik (+ Kontaktfungizid)	Kaliumphosphonat	1.000 ml	-
	Veriphos (+ Kontaktfungizid)	Kaliumphosphonat	1.000 ml	-
Oidium	Custodia	Azoxystrobin + Tebuconazol	175 ml	x
	Kumar	Kaliumhydrogencarbonat	1.250 g	-
	Kusabi / Powdrio	Pyriofenone	75 ml	-
	Microthiol WG	Schwefel **	6.000 g **	-
	Netzschwefel z.B. Thiovit Jet, Kumulus WG, Netz- Schwefelit WG, Netzschwefel Stulln	Schwefel **	3.600 g **	-
	Netzschwefel Stulln Netz-Schwefelit WG	Schwefel **	5.000 g **	-
	Prosper Tec	Spiroxamine	330 ml	-
	Spirox	Spiroxamine	200 ml	-
	SulfoLiq 800 SC	Schwefel **	nur bis ES 75 max. 4.000 ml **	-
	Pol-Sulphur 800 SC			
	Vivando	Metrafenone	80 ml	-

Achten Sie darauf, dass beim Einsatz von Phosphonaten immer ein gängiges Kontaktmittel beigemischt und mit appliziert wird. Bei anstehenden Applikationen sollte mit reduzierter Luftmenge gesprüht werden. Um Abdrift so gering wie möglich zu halten müssen grobtropfige und abdriftarme Injektordüsen verwendet werden. In extrem weit fortgeschrittenen Anlagen, kann bereits mit dem Faktor 1,5 berechnet werden.

Bernkastel-Kues, 08.05.2024

Team Rebschutz und Weinbau des DLR Mosel

Weitere Informationen zu Weinbau und Oenologie finden Sie auch auf unserer Homepage www.dlr-mosel.rlp.de oder auf der Homepage der Agrarverwaltung Rheinland-Pfalz unter www.dlr.rlp.de.

Newsletter-Abmeldung [Hier](#) können Sie sich schnell und unkompliziert abmelden