

Kirschfruchtfliege (*Rhagoletis cerasi*) und Kirschessigfliege (*Drosophila suzukii*) Bekämpfungsstrategie 2025 für RLP-Süd (Stand: 06.06.2025)

Kirsch-woche	Frühreifende Sorten	erwarteter Erntebeginn 2025	Mospilan SG (21 Tage vor Ernte) 0,125 kg/ha mKH	Exirel* (14 Tage vor Ernte) 0,375 l/ha mKH	Mospilan SG (7 Tage vor Ernte) 0,125 kg/ha mKH		Exirel* (7 Tage vor Ernte) 0,375 l/ha mKH	Spintor ** (7 Tage vor Ernte) 0,075 l/ha mKH
2	Charmes, Burlat, Earlise	27.5	-	13.5	20.5		-	-
3	Bellise, Merchant	6.6	-	23.5	30.5		-	-
3-4	Carmen, Samba, Celeste, Christiana, Grace Star, Giorgia, Summit, Favorit	11.6	21.5	28.5	4.6		-	4.6
	Mittelfreifende Sorten		Exirel* (21 Tage vor Ernte) 0,375 l/ha mKH	Mospilan SG (14 Tage vor Ernte) 0,125 kg/ha mKH	Spintor ** (10 Tage vor Ernte) 0,075 l/ha mKH	Mospilan SG (10 Tage vor Ernte) 0,125 kg/ha mKH	Exirel* (7 Tage vor Ernte) 0,375 l/ha mKH	Spintor ** (5 Tage vor Ernte) 0,075 l/ha mKH
4	Satin, Starking H.G., Van, Sam, Sunburst, Vanda, Korvik, Achat	15.6	25.5	1.6		5.6	8.6	10.6
4a	Bei hohem KEF-Druck	15.6	25.5	1.6	5.6	5.6	8.6	10.6
5	Sylvia, Techlovan, Schneiders, Haumüller, Kaiserkirschen, Jade, Morellenfeuer	18.6	28.5	4.6		8.6	11.6	13.6
5a	Bei hohem KEF-Druck	18.6	28.5	4.6	8.6	8.6	11.6	13.6
	Spätreifende Sorten		Exirel* (21 Tage vor Ernte) 0,375 l/ha mKH	Mospilan SG (21 Tage vor Ernte) 0,125 kg/ha mKH	Mospilan SG (14 Tage vor Ernte) 0,125 kg/ha mKH	Spintor ** (10 Tage vor Ernte) 0,075 l/ha mKH	Exirel* (7 Tage vor Ernte) 0,375 l/ha mKH	Spintor ** (5 Tage vor Ernte) 0,075 l/ha mKH
6	Hedelfinger, Kordia, Lapins, Tamara, Skeena, Regina, Axel, Heim. Rubin	24.6	3.6 oder	3.6	10.6	14.6	17.6	19.6
7	Regina, Sweetheart, Gerema	30.6	9.6 oder	9.6	16.6	20.6	23.6	25.6
8	Hudson, Schattenmorelle, Ung.Traubige, Löwöpetri	5.7	14.6 oder	14.6	21.6	25.6	28.6	30.6

Benutzungshinweis:

Zur Anpassung der Reifeentwicklung an den jeweiligen Standort nur die Erntetermine in der roten Spalte verändern.

Datumsangabe ohne Punkt hinter Monat: z.B. 13.6

mKH = Aufwandmenge pro Meter Kronenhöhe

Farbumschlag grün-gelb etwa 3 bis 2 Wochen vor Ernte

Farbumschlag gelb-rot etwa 1 bis 2 Wochen vor Ernte

*Exirel Notfallzulassung nach Art. 53 der VO (EG) 1107/2009 von 09.05.-05.09.2025 Gesamtaufwandmenge max. 2,0 l/ha pro Jahr

Exirel-Anwendung bei hoher Flugaktivität evtl. auch vor oder zwischen den Mospilan-Behandlungen

**Spintor: Zulassung nach Art. 53 der VO (EG) Nr. 1107/2009 von 23.05.-19.09.2025, Gesamtaufwandmenge max. 0,3 l/ha pro Jahr